

แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน/องค์กรในพื้นที่รัศมี ๕ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

แนวทางการป้องกัน

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเมินว่าสุนัขในพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากการรณรงค์ในรอบปีปัจจุบันที่ระดับใด หากไม่มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนหรือฉีดได้ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ให้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบพิเศษโดยเร็ว โดยฉีดให้สุนัขอายุ ๒ เดือนขึ้นไปทั้งหมดที่มีในพื้นที่ทั้งที่มีและไม่มีเจ้าของ อย่างน้อยที่สุดฉีดให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรค
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เตือนประชาชน
 - (๑) ให้ทราบสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จุดที่กำลังเกิดโรค
 - (๒) ให้ป้องกันตัวเอง อย่างยุ่งหรือเข้าใกล้สุนัขหรือ สัตว์ต่างๆ นอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ หากต้องการนำมาเลี้ยงให้นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและกักสุนัขสังเกตอาการให้ครบ ๑๐ วัน เสียก่อน
 - (๓) ให้รู้วิธีจัดการที่ถูกต้องเมื่อตนเองหรือสัตว์เลี้ยง ถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน เลีย หากไม่แน่ใจควรขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เพราะโรคนี้หากปล่อยไว้จนแสดงอาการจะรักษาไม่ได้ ตาย ๑๐๐% ทั้งในคนและสัตว์ แต่สามารถป้องกันโดยไปรับวัคซีนป้องกันทันทีหลังสัมผัสเชื้อโรคจากการถูก กัด ข่วน เลีย
 - (๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสาน โรงเรียน และวัด ให้ช่วยแจ้งเตือน เด็กนักเรียน พระสงฆ์ และประชาชนทั่วไป เรื่องสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันตัวเอง การจัดการเมื่อตนเองหรือสัตว์เลี้ยง ถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน เลีย

แนวทางการเฝ้าระวัง

๑. สร้างเครือข่ายรับแจ้งเหตุและเก็บตัวอย่างสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ส่งตรวจยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการ ผ่านปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัด
๒. ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน เจ้าของ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ที่เลี้ยงปล่อยทุ่งหรือคอกเปิดใกล้ถนน เจ้าของสุนัข แมว ที่เลี้ยงปล่อย ให้ตรวจสอบสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อทราบข่าวว่าเกิดโรคพิษสุนัขบ้า หากพบร่องรอยสัตว์ถูกกัด หรือเห็นเหตุการณ์สัตว์ถูกสุนัขกัด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบและพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ที่ถูกกัดทันที